INFORMACJA DLA PACJENTA

Jak przygotować się do operacji?

W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia miejsca operowanego zaleca się odpowiednie przygotowanie skóry oraz jam nosa. U części pacjentów może występować bezobjawowa kolonizacja bakteryjna, w tym Gronkowiec złocisty (*Staphylococcus aureus)*, która zwiększa ryzyko powikłań infekcyjnych po zabiegu. Zastosowanie zaleconych preparatów pozwala na ograniczenie tego ryzyka.

Zaleca się rozpoczęcie stosowania preparatu do nosa na 7 dni przed planowanym zabiegiem. W przypadku otrzymania zaleceń w terminie późniejszym należy rozpocząć stosowanie niezwłocznie.

Nos

- np. Prontoderm Nasal Gel (bez recepty) – stosować 3 razy dziennie do obu nozdrzy przez 5 dni (zaleca się używanie osobnego aplikatora/patyczka do każdego nozdrza) lub
- np. Bactroban maść do nosa (na receptę) – stosować 2–3 razy dziennie przez co najmniej 7 dni

Skóra

- Myć całe ciało codziennie preparatem antyseptycznym (np. Prontoderm, Manusan, Hydrex S)
- Stosować przez 5–14 dni przed zabiegiem
- Po umyciu dokładnie spłukać preparat i osuszyć skórę czystym ręcznikiem

Ważne
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub innych niepokojących objawów należy przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z personelem medycznym.

lek. med. Filip Adamczewicz
Specjalista Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu
2655578